

Clinical questions・推奨一覧

各論

CQ 1 髄芽腫に対する術後放射線治療として陽子線治療は推奨されるか？

推奨 髄芽腫に対する術後放射線治療として、陽子線治療を行うことは推奨できる（エビデンスレベルB，強く推奨）。

CQ2 上衣腫に対する術後放射線治療として陽子線治療は推奨されるか？

推奨 上衣腫に対する術後放射線治療として、陽子線治療を行うことは提案できる（エビデンスレベルC，弱く推奨）。

CQ3 切除不能および術後に遺残した頭蓋咽頭腫に対して陽子線治療は推奨されるか？

推奨 切除不能および術後に遺残した頭蓋咽頭腫に対する放射線治療として、陽子線治療を行うことは提案できる（エビデンスレベルC，弱く推奨）。

CQ4 頭蓋内胚細胞腫瘍に対する全脳室照射，全脳全脊髄照射において陽子線治療は推奨されるか？

推奨 頭蓋内胚細胞腫瘍に対する全脳室照射，全脳全脊髄照射において陽子線治療は提案できる（エビデンスレベルD，弱く推奨）。

CQ5 横紋筋肉腫に対して陽子線治療は推奨されるか？

推奨 横紋筋肉腫に対して陽子線治療を施行することを提案する（エビデンスレベルC，弱く推奨）。

CQ6 神経芽腫の原発巣に対する放射線治療として陽子線治療は推奨されるか？

推奨 神経芽腫の原発巣に対する放射線治療として、有害事象の低減が期待できる場合、陽子線治療を行うことは提案できる（エビデンスレベルD，弱く推奨）。

CQ7 切除不能または不完全切除された小児骨肉腫に対して陽子線治療は推奨されるか？

推奨 切除不能または不完全切除された小児骨肉腫に対する放射線治療に陽子線治療を用いることは提案できる（エビデンスレベルC，弱く推奨）。

CQ8 ユーイング肉腫ファミリー腫瘍（Ewing sarcoma family of tumors：ESFT）に対して陽子線治療は推奨されるか？

推奨 小児ESFTに対する放射線治療として，有害事象の低減が期待できる場合，陽子線治療を行うことは提案できる（エビデンスレベルD，弱く推奨）。

CQ9 切除不能または不完全切除された脊索腫，軟骨肉腫に対して陽子線治療は推奨されるか？

推奨 切除不能または不完全切除された小児脊索腫，軟骨肉腫に対する放射線治療として，陽子線治療を行うことを提案する（エビデンスレベルC，弱く推奨）。